

LE FRELON ASIATIQUE ET SES CONGENERES



BON A SAVOIR :

Le frelon asiatique est peu agressif spontanément SAUF s'il est dérangé, auquel cas il peut attaquer en groupe d'une manière virulente. Son venin n'est pas particulièrement toxique, en revanche les facteurs de risques comme pour toute piqûre d'insecte sont aggravés en cas de **piqûres multiples, de piqûres des muqueuses et d'hypersensibilité au venin d'hyménoptères** (guêpes, abeilles, bourdons, frelons).

COMMENT REAGIR ?

En prévention :

Il convient d'être prudent et de ne pas s'approcher à moins de 5 M du nid .

Ne pas chercher à détruire soi-même les nids et faire appel à des professionnels :

- Sur le domaine privé c'est une entreprise privée relevant de l'activité « services de désinfection, dératisation et désinsectisation » qui intervient.
- Sur le domaine public, ce sont les sapeurs pompiers dès lors qu'il y a un risque particulier pour des tiers.

En cas de piqûre :

Surtout **RESTEZ CALME**. Les piqûres très douloureuses, causent généralement une simple réaction locale qui n'est pas dangereuse **SAUF** en cas de **facteurs de risques aggravants**. Faites appel aux professionnels de santé et prévenez l'Association !



Dans tous les cas : soyez vigilants sur l'environnement de travail... et au moindre doute, n'intervenez pas !

LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE



Après sa nidification dans les pins, la chenille processionnaire du pin quitte le sommet de l'arbre pour descendre s'enterrer et se transformer en papillon de nuit.

Elle présente la particularité d'avoir des **poils très urticants**. Que l'on soit directement en contact avec la chenille ou que les poils se détachent de la chenille et viennent en contact avec la peau.

Ce contact déclenche des réactions de type **démangeaisons** mais peut aussi aller jusqu'au choc anaphylactique. A terme, elle peut générer des allergies.

Il est important de consulter en cas de réactions au niveau de l'œil ou si la réaction dépasse le stade du local.

Portez des gants, des lunettes de protection et des vêtements couvrants.



**Que faire en cas d'incident?
Si besoin alertez les secours, le 15 ou le 112
depuis un portable, et prévenez
ensuite l'association dans les
plus brefs délais.**


Signalez à l'utilisateur la présence d'espèces nuisibles ou de plantes allergisantes dans son environnement.

Association intermédiaire

Coordonnées

LES DANGERS DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

MIEUX LES CONNAITRE POUR MIEUX LES PREVENIR



ELORYS
SERVICES SOLIDAIRES

LES TIQUES

Les tiques sont des acariens parasites vivant dans les zones boisées et humides mais aussi dans les prairies et se nourrissant du sang de leurs hôtes.



LE DANGER : Elles peuvent transmettre de multiples virus et bactéries responsables de maladies telle que la maladie de Lyme.



LES BONS REFLEXES :

* Avant et pendant une activité nature, il faut :

- Couvrir bras et jambes de vêtements longs.
- Rester sur les chemins, éviter les broussailles, les fougères et les hautes herbes.
- Penser à prendre avec vous un tire-tique.
- Mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau ou sur les vêtements, en respectant le mode d'emploi.

* Après une activité dans la nature : **J'inspecte** soigneusement mon corps.

EN CAS DE PIQURES : Ne mettez aucun produit sur la tique. Ne tentez pas de la retirer avec les ongles.

Utilisez un tire-tique :



Glissez le crochet sous la tique sans l'écraser, au plus près de la peau. Tournez doucement jusqu'à ce que la tique se décroche. Après avoir enlevé la tique, **désinfectez** la peau avec un antiseptique.



Je surveille la zone piquée 1 mois. Si une plaque rouge et ronde s'étend en cercle, je dois consulter un médecin rapidement. Je consulte également en cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle.

La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.

En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.

LA MORSURE DE VIPERE

Le mot morsure est utilisé lorsqu'il y a des plaies occasionnées par des dents ou crochets.



LE DANGER :

Les vipères n'attaquent que lorsqu'elles se sentent en danger, d'avril à septembre. Les **morsures** de vipères sont rarement **mortelles**.

LE RISQUE :

Inoculation de substances toxiques, appelée « venin » :

- Manifestations locales
- Détresses vitales




LES BONS GESTES :

Prévention

- Mettre un pantalon long, des bottes ou des chaussures fermées.
- Prendre un bâton.
- En cas de rencontre avec une vipère, continuer la route en faisant un écart.
- Éviter les lieux à risque.
- Ne pas glisser les mains sous des pierres ou dans les trous.



En cas de morsures



LA BERCE DU CAUCASE

La berce du Caucase est une herbacée annuelle de très grande taille. Il s'agit d'une plante invasive. Elle se propage très rapidement et a des conséquences sur la santé.



RECONNAISSANCE :

Elle est de très grande taille; 2 à 5m de haut. Les feuilles peuvent atteindre 1m de long et 50 cm de large. La tige est robuste souvent tachetée de pourpre et couverte de poils blancs rigides.



RESSEMBLANCE :

La berce du Caucase n'est pas à confondre avec la berce commune de plus petite taille ; 1.5m et des feuilles lobées parfois dentées.

Et avec la carotte sauvage faisant jusqu'à 50 cm de haut.



RISQUES :

La sève de la berce du Caucase est photo-toxique quand elle est en contact avec la peau et que la personne est exposée au soleil. Elle provoque des brûlures importantes. Le contact est indolore. La peau devient rouge, gonflée, des cloques mettent 1 à 2 jours à apparaître.



PREVENTION :

Se munir des Equipements de protection individuelle : combinaison imperméable, lunettes, visière, gants. Ne pas se toucher le visage avec les gants et nettoyer les outils après utilisation pour éliminer la sève.

En cas d'exposition, enlevez la sève avec un papier absorbant sans frotter et lavez avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec l'œil, rincez à l'eau claire. Évitez d'exposer la zone au soleil. Consultez un médecin rapidement en cas d'exposition.